

Analytische Chemie

I en II

- [2011 juni examen](#)
- [2012 juni examen](#)
- [2014 juni examen](#)
- [2015 augustus examen](#)
- [2016 juni examen](#)
- [2016 juni examen](#)
- [2018 juni examen](#)
- [2015 juni examen \(Vroeger Moleculaire architectuur\)](#)
- [2021 Januari Labo Examen \(Analytische I\)](#)
- [2022 Januari Examen Analytische Chemie I Theorie & Oefeningen](#)
- [juni 2022 analytische II](#)
- [2023 juni Examen Analytische chemie II](#)
- [2023 Juni Lab Examen Analytische II](#)
- [2024 januari labo examen Analytische chemie I](#)
- [2024 januari Analytische Chemie I](#)
- [2024 juni Analytische chemie II](#)
- [2024 Juni Lab Examen Analytische II](#)

2011 juni examen

Theorie

1)a) Verklaar rechtstreekse en onrechtsreekse invloed van pH op de oplosbaarheid adhv de voorbeelden $\text{Mg}(\text{OH})_2$ en CaOx b) Verklaar de invloed van elektrolyten op de pH 2) a) voor de redoxreactie van Fe^{2+} en MnO_4^- de K'_{ev} berekenen b) titratie van Fe^{2+} 100ml 0.1M met MnO_4^- 0.02M bij pH 0, 2 en 4 na toevoegen van 0 ml, 90ml, 100ml en 110 ml MnO_4^- c) iets met thiosulfaat bij jodi en jodometrie

Vraag 1: a) de formule afleiden voor de berekening van amfoteer H_2PO_4^-

vereenvoudigde formule + correcte formule

b) titratiecurve van H_3PO_4 met HCl tekenen en berekenen met vereenvoudigde formules

alle belangrijke punten weergeven

c) juiste indicator kiezen voor elk equivalentiepunt van b)

(tabel met indicatoren is gegeven)

Vraag 2: a) uitleggen wat een chelaatverbinding is + de stabiliteit van complex uitleggen i.f.v. de pH en de lading van de metaalionen b) titratiecurve van 10,0 ml Mg^{2+} 0,100M met EDTA 0,100M berekenen en tekenen.

na toevoegen van 5ml, 10ml en 11ml EDTA

c) de werking van Eriochroom Zwart T uitleggen a.d.h.v. een titratie van Ca^{2+} via de directe methode

vraag1 a) relatieve oververzadiging ifv $v_{\text{kiemvorming}}$ en V_{aangroei} b) werkomstandigheden voor kristallijne en colloïdale neerslag c) waarom geen colloïdale neerslag bij gravimetrische bepaling d) leg elektrische dubbellaag uit adhv AgCl

vraag 2 a) afleiding van K_{ev} van Fe^{2+} met Ce^{4+} b) titratiecurven van Fe^{2+} met Ce^{4+} c) leg redoxindicator uit d) leg werking van ferroïne uit bij cerimetrie (Ce^{4+} met Fe^{2+})

vraag1: heel hoofdstuk 5 (kiemen - aangroei van neerslaande deeltjes) vraag2: berekenen van Kev van Fe^{2+} en Ce^{4+}

Oefeningen

1) pH- berekeningen

- a) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{KOH}$
- b) $\text{HNO}_3 + \text{KOH} + \text{NaCl}$

2) gegeven: K_2CrO_4 -opl: 0. 0136m en 1.49N. bereken (zie oef 30 (die tabel))

3) pH van begin neerslag en kwantitatieve neerslag: gegeven concentraties Co en H_2S

4) zie herhalingoef redox: oef 8b) $\text{N}_2 + \text{N}_2\text{O}_4 \leftrightarrow \text{NO}$

leid af en bereken Kev
Reactie spontaan? en Kwantitatief?

Vraag 1: gegeven: HNO_3 : 10,4 N en 50,0 m% a) tabel p.30 cursus

bereken M, m, g/l, X, dichtheid

b) Verdunning:

25ml HNO_3 (10,4 M) wordt in een maatkolf van 500ml gebracht en aangelengd met H_2O .
Hiervan wordt 10ml gepipetteerd in een maatkolf van 200ml en aangelengd met H_2O .
Bereken de eindconcentratie van de HNO_3 -opl + #mg HNO_3 /100ml

Vraag 2: bereken de pH van het mengsel: 50,00ml NH_4Cl 0,100M 10,00ml NH_3 0,050M 20,00ml KOH 0,050M 10,00ml NaOH 0,050M

Vraag 3: Hoeveel ml HCL (0,0982M) moet men toevoegen aan Na_3PO_4 (0,100M) om de kleuromslag van MO waar te nemen?

Vraag 4: Redoxtitraties: aan 0,0200M Cu^{2+} wordt een overmaat Pb toegevoegd. a) Kev afleiden en berekenen b) bij evenwicht Esysteem berekenen + $[\text{Cu}^{2+}]$ berekenen

2012 juni examen

theorie

1) alles van hoofdstuk 5 (kristallijne/colloïdale neerslag) 2) - afleiding Kev bij complexen - titratie curve ijzer 2 en cerium 4 - alles over inwendige redoxindicatoren

oefeningen

1) vraag gelijk tabel p.30 2) complexometrische titratie van ijzer 2 en cerium 4 de concentratie van ijzer 3 fzo bepale 3) weetk ni meer

2014 juni examen

Theorie (2vragen)

1. a) methode van Noyes, ma ni gwn da, specifiek het verschil tss 2 en 3 waardig positieve metaalionen in zuur en basisch milieu

b) uitrekenen bij welke pH CdS kwantitatief is neergeslagen en kijken of MnS bij die pH al begint neer te slaan

2. a) cerimetrie: Kev berekenen voor oxidatie van Fe^{2+} met Ce^{4+}

b) titratiecurve (E ifv V) voor Ce^{4+} getitreerd met Fe^{2+} en E-waarde berekene bij 0, 10, 100 en 110ml toegevoegd titrans

OF

1) Oplosbaarheid

-> aangroei + kiemvorming met Q-s/s uitleggen (met grafieken)

-> colloïdale kristallijne neerslag: hoe bekomen?

-> dubbele elektrische laag

-> gravimetrie: wrm geen colloïdale neerslag?

2) Neerslagtitratie

-> bij 0ml, 90ml, 100ml (=EP) en 110ml -> pCr2O7 en pAG -> titratiecurve (met beide p-functies erin)

-> methode van Mohr en Fajans (indicators uitleggen)

OF

1) Factoren die de oplosbaarheid beïnvloeden

-> Je hebt een MI-neerslag (ik weet niet juist meer welk metaal) en daaraan voeg je KI toe. Leg de invloed van het gemeenschappelijk ion kwalitatief en kwantitatief uit.

-> Leg de rechtstreekse invloed van de pH kwantitatief uit a.d.h.v. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ bij pH= 1, 5 en 12.

-> Leg de invloed van elektrolyten uit.

(TIP: Dit kwantitatief uitleggen doe je best door de oplosbaarheid s te berekenen)

2) Neerslagtitraties

-> Een titratiecurve van het type M2Z (Ag_2CrO_4) uitwerken (met de vereenvoudigde berekeningen: 0ml; 10 ml voor E.P., op E.P., 10 ml na E.P.).

-> Leg de werking van de indicator (K_2CrO_4) bij de methode van Mohr uit. Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan? Wat gebeurt er als de pH te zuur/te basisch is?

-> Leg de werking van de indicator (fluoresceïne) bij de methode van Fajans uit. Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan?

Oefeningen:

1. geg: H_2SO_4 25 m% en $N=6,02$; gezocht: de rest

2. pH berekenen, KOH, HCl en $(\text{COOH})_2$

3. $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2$ en $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$, bereken MnO_4^-

OF

1. geg: verschillende stoffen waarvan jij nog de juiste M moet zoeken (zoals tabel oef 30)

gezocht: a) de concentratie die je bekomt als je deze stoffen samenbrengt (mengt)

b) hoeveel liter van deze concentratie (= gegeven) moet je erbij doen om een mengsel te bekomen met deze concentratie (=gegeven)

2. de pH berekenen van een mengsel van 3 stoffen

3. het volume berekenen dat nodig is aan HCl om PO_4^{3-} te titreren tot een pH van 3,63. De concentratie PO_4^{3-} en HCl zijn gegeven, het volume PO_4^{3-} ook.

Juni 2014.

Analytische Chemie Theorie:

1.oplosbaarheid

a) Leg uit de invloed van rechtstreekse pH en onrechtstreekse pH dat aan de hand van $\text{Mg}(\text{OH})_2$ en calciumoxalaat

b) Bij methode van Noyes, gebruiken we H_2S als neerslagreagens. Wanneer zal een neerslag kwantitatief neerslaan? (leg dat uit met $\text{Cd}^{2+}/\text{Mn}^{2+}$

2. redoxtitraties.

- a) Kev geven van $\text{Fe}(2+)$ en MnO_4^- en ook uitleggen , eigenlijk dat gewoon in functie van de pH
- b)zet de titratiecurve uit voor $\text{pH}=0, \dots$ waarbij het volume van MnO_4^- uitgezet t.o.v. E-waardes.
($\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^-$) Bereken u reductiepotentialen bij 0mL, 90mL, 100mL, 110mL
- c) verwoord de standaardisatie van $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ met IO_3^- gewoon door reactievergelijkingen te geven.
(zie labo!)

en ook wanneer en waarom gebruiken we zetmeel als specifieke redoxindicator.

Oefeningen:

- 2 mengsel waarvan g de pH moest berekenen mengsel 1: $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_3$ mengsel 2: $\text{HNO}_3 + \text{NaCl}$
- bereken de oplosbaarheid van PbI_2 + hoeveel van de 5g gaat niet oplossen in 2L?
- gaat de oplosbaarheid van PbI_2 verhogen, verlagen, hetzelfde blijven bij toevoeging van NaI 0.100M
- HNO_3 m%=50% en $N=10.4$. Geeft de molaliteit, dichtheid en molfractie.
- Reductiepotentiaal bepalen

2015 augustus examen

1. a) Leg uit welke factoren de oplosbaarheid beïnvloeden, rechtstreekse pH en onrechtstreekse pH dat aan de hand van $\text{Mg}(\text{OH})_2$ en calciumoxalaat b) Leg met de H_2S methode van Noyes het neerslaan metaalionen uit en de invloed van de pH

2. A) Geef de redoxtitratie van Fe^{2+} 100ml 0.1M met MnO_4^- 0.02M bij pH 0, 2 en 4 na toevoegen van 0 ml, 90ml, 100ml en 110 ml MnO_4^- B) Leg de werking uit van een indicator die gebruikt wordt bij een jodi en jodometrie. Iets met thiosulfaat...

Oefeningen:

1. oefeningen met m%, molfractie, d, formaliteit, normaliteit, molaliteit 2. Bereken de PH van $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NaOH}$ mengsel. 3. Redoxpotentialen

2016 juni examen

theorie 1 vragen over oplosbaarheid (temperatuur, gemeenschappelijk ion, pH rechtstreeks kunnen aantonen via berekening met behulp van K_{sp} en elektrolyt) 2 redoxtitratie van cerium met ijzer en dan nog bijvraagjes over redoxindicatoren

2016 juni examen

Theorie

1) a. Verband tussen oplosbaarheid en oplosbaarheidsproduct van stoffen met verschillende formules aantonen met AgCl en Ag_2CrO_4

b) Invloed van gemeenschappelijk ion aantonen met $\text{Ba}(\text{IO}_3)_2$ in aanwezigheid van KIO_3 .

2) Complexometrische titratie: Mg^{2+} met EDTA.

Oefeningen:

1) Oplosbaarheid en Verdunning

2) pH berekenen van een mengsel van 50ml NH_4Cl 0,1M; 20ml NH_3 0,05M ; 10ml NaOH 0,05M en 20ml KOH 0,05M

3) Cu^{2+} 0,2M reageert met een overmaat van Pb a) K_{eq} afleiden en berekenen b) E_{systeem} en concentratie Cu^{2+} bij evenwicht berekenen

2018 juni examen

Theorie 1. a) Het gemeenschappelijk ion effect kwalitatief uitleggen en kwantitatief uitleggen a.h.v. PbI_2 dat oplost in 0,1 M KI. b) De rechtstreekse en onrechtstreekse invloed van de pH uitleggen bij de oplossing van $\text{Mg}(\text{OH})_2$ en calciumoxalaat.

2. a) De titratie van 100 ml AgNO_3 0.1 M met Na_2CrO_4 0,05 M bij toevoeging van 0 mL, 90 mL, 100 mL en 110 mL titrans. Vervolgens dient men de pAg en pCrO_4 te berekenen en in een grafiek weer te geven in functie van het volume toegevoegd titrans. b) De werking van de indicator fluoresceïne bij de titratie van Cl^- -ionen met Ag^+ -ionen met de methode van Fajans theoretisch uitleggen.

Oefeningen 1. a) Een massa kaliumdichromaat ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) wordt opgelost in een maatkolf van 50 mL en vervolgens wordt hiervan 5 mL gepipetteerd en in een andere maatkolf (verschillend volume) overgebracht en aangelegd. Dit wordt enkele keren gedaan telkens met verschillende volumes. Uiteindelijk dient men de concentratie kaliumdichromaat in mmol/L te geven en de concentratie chroom in mg/L. b) Het oplosbaarheidsproduct van $\text{Pb}(\text{OH})_2$ berekenen bij een bepaalde pH.

2. De pH berekenen van een mengsel van HCl, HBr, CH_3COOH en CH_3COONa . Alle volumes en concentraties zijn gegeven.

3. De evenwichtsconstante van een redoxreactie berekenen als de standaardreductiepotentialen van gelijkaardige redoxreacties zijn gegeven. (Deze reacties samen kunnen onrechtstreeks leiden naar de reactie waarvan je de evenwichtsconstante moet berekenen.)

2015 juni examen (Vroeger Moleculaire architectuur)

lector: T. Mortier

vraag 1

5 moleculen gegeven. Bepaal de puntgroepen van deze moleculen.

vraag 2

2 moleculen gegeven. Puntgroepen bepalen, chiraliteit bepalen en polariteit bepalen.

vraag 3

2 escher figuren: symmetrie-elementen aanduiden, eenheidscel zoeken en de naam van de vlakgroep geven

vraag 4

2 eenheidscellen gegeven (projectie langs de c-as). Voer de symmetrie operatie uit en schrijf de coördinaten van de positie.

vraag 5

vraagstuk: bereken de hoek van $\{100\}$, $\{010\}$, $\{111\}$ vlakken (orthomerisch). Golflengte, a, b en c = gegeven.

vraag 6

Geef de irreduceerbare representatie. Karaktertabel = gegeven.

2021 Januari Labo Examen (Analytische I)

Hoe gaat examen labo analytische chemie eruit zien?

Praktijk: Voorbereiding maken zoals we gezien hebben, met berekeningen, doel, besluit, titratieschema,... en dan uitvoeren, dan concentratie zoeken en ge moet uw resultaat omrekenen naar 2 andere dingen bv g/100ml of g/1000ml of g/mmol of massaprocent,... en da moe ge dan indienen.

(XXXXXXXXXX had lab 6 standaardisatie I en titratie analiet uitvoeren en zij moest dacht ze indienen in I_3^- in g/100ml en I_2 in g/mmol)

Praktijk totaal 25 punten	3: Reacties
	6: Titratieschema
	3: Massa afwegen
	4: juistheid op resultaten dat je indient
	3: doel
	2: Besluit
	4: Berekeningen

Toledo-toets totaal 15 punten	4: Buffer, massa of volume berekenen om aftewegen
	5: Meerdere titratieschema's en de juiste aanduiden
	6 (3 per vraag): 2 meerkeuzevragen (5 antwoorden, meerdere antwoorden mogelijk en nul als je iets vergeet)

2022 Januari Examen

Analytische Chemie I Theorie & Oefeningen

Theorie:

Vraag 1:

2 EP van 0,1M Na_2CO_3 getitreerd met 50ml HCl berekenen door de vereenvoudigde formule af te leiden (verwaarlozingen verklaren) en per EP een indicator toewijzen. (Grafiek gegeven, tabel van indicatoren gegeven)

Vraag 2:

Galvanische cel met Cu en Ag gegeven, lijndiagram opstellen, kathode/anode benoemen, thermodynamische potentiaal berekenen, redoxreactie opstellen, evenwichtsconstante berekenen

Oefeningen:

Vraag 1:

10ml HClO_4 0,8M

10ml NaClO_4 0,5M

10ml NaOH 0,4M

10ml HClO 1,7M

pH van mengsel berekenen + α (ionisatieconstante) van de z/b reactie berekenen

juni 2022 analytische II

Theorie

- a) chelaatverbinding + stabiliteit ifv pH en lading
- b) titratiecurve tekenen + bereken (Mg en EDTA)
- c) titratiecurve van CH_3COOH en NaOH uitleggen aan de hand van grafiek + EP aanduiden
- d) factoren die de geleidbaarheid beïnvloeden

Oefeningen

- a) oplosbaarheid van Al_2S_3 met concentratie H_2S en pH gegeven
- b) oefening op de wet van Lambert-Beer

2023 juni Examen

Analytische chemie II

Theorie:

Vraag 1: Gemeenschappelijk ion effect uitleggen; PbI_2 oplossing bij toevoegen van KI

Vraag 2:

a) Berekenen titratiecurve 100 mL NaCl 0,1M met AgNO_3 0,1M op 0mL, 90 mL, 100 mL en 110 mL. pCl uitzetten in functie van toegevoegd volume AgNO_3

b) Invloed van verdunningen op pCl uitleggen

c) Invloed van andere K_{sp} waardes op pX uitleggen (X: Br, Cl, I)

Vraag 3: Conductometrische titratiecurve gegeven (100 mL CH_3COOH + NaOH 0,1012M)

a) Verloop hiervan uitleggen

b) EP aanduiden en concentratie CH_3COOH ongeveer bepalen

Oefeningen:

Vraag 1: Ni^{2+} oplossing met H_2S , bepaal pH waarde waar de neerslag begint te vormen

Vraag 2: paracetamoloplossing met gekende concentratie wordt verdund en A gemeten. Tablet wordt opgelost en verdund, en daarvan wordt ook A gemeten.

a) Bepaal moleculaire extinctiecoëfficiënt

b) Bepaal massa van paracetamoltablet

c) Bepaal absorptantie wanneer cuvetje maar 0,5 cm lang is

d) Bepaal energie van 1 foton bij 423 nm

2023 Juni Lab Examen

Analytische II

Neerslagtitratie: Cl staal -> starttitratieschema maken met alle stoffen, volumes, concentraties,... van standaardisaties en titratie analiet

Enkel titratie analiet uitvoeren en concentratie onbekend staal bepalen (in mM, g/L, ...)

Spectrofotometrie: stock met gekende concentratie -> verdunnen en daar spectrum van opmeten

Onbekende stock -> verdunnen en A meten

Concentratie onbekende bepalen via functievoorschrift ijklijn (is gegeven)

Toledotoets: 4 vragen

2024 januari labo examen

Analytische chemie I

1) Titrimetrie

Gegeven:

Titratieschema opstellen voor onverdunde Trijodide stockoplossing met $c = \pm 0,024 \text{ M}$

Je krijgt een individueel volume bv 20,00 ml die je moet aanlengen tot 100,00 ml.

Gebruik 1 standaardisatiestap en methode 2 voor de Primaire Standaard.

(tip bij titratieschema ken de specifieke zuur-base indicatoren per labo per reactie.)

Je mag kiezen tussen bepaalde stoffen net zoals gegeven op het voorbeeld examen:

- azijnzuur (conc) 17 M
- zoutzuur (conc) 11,5 M
- natriumhydroxide (conc) 2,5 M
- KHftalaat vast
- Tris
- Borax vast
- Zuur-base indicator druppelflesje

Op het einde moet de concentratie berekend worden in 2 van de verschillende 4 opties die ook individueel zijn.

- mg/100ml
- mmol/1000ml
- ...
- ...

Gevraagd:

A) Formuleer doel

B) Titratieschema

C) Massa primaire standaard berekenen

D) Halfreacties uitschrijven

E) Formuleer besluit

2) X-toledo toets

(Verschilt per individu dus versie 2 --> persoon 2)

vraag 1)

Je krijgt vier ingevulde titratieschema's en moet kunnen aanduiden welke correct is.

gegeven: analiet is HCl met $c = 0,08 \text{ M}$

Titrans telkens NaOH

PS KHft of Tris

Vraag 2)

Buffer mengsel maken van $\text{pH} = 6,8$ vertrekkend van 30,00 ml HCL (methode 2)

gevraagd: geef de massa of volume van de base

kiezen uit de 4 buffermengsels

Gebruik NaH_2PO_4 / Na_2HPO_4 $\text{pK}_z = 7,20$ ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: vaste stof / $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$: vaste stof)

Belangrijk bij molaire massa de H_2O 's niet vergeten optellen aan totaal.

Vraag 2) (versie 2)

Buffer mengsel maken van $\text{pH} = 9,9$ vertrekkend van 30,00 ml NaOH (methode 2)

vraag 3)

Meerkeuzevraag Juist/fout vragen duid juist aan

- De titratie van Fe^{2+} met KMnO_4 moet traag gebeuren.
- De titratie van Fe^{2+} met MnO_2 moet warm gebeuren.
- ...
- ...

vraag 3) (versie 2)

Meerkeuzevraag over welke volgorde de toevoeging van Fe^{2+} , zuur en ClO_3^- moet toegevoegd worden.

vraag 4)

Meerkeuzevraag over redoxtitratie van Trijodide en thiosulfaat over wie reductor en oxidator voor én na de reactie.

2024 januari Analytische Chemie I

Theorie

Vraag 1) 10 punten

2 titraties uitschrijven en schetsen op dezelfde grafiek

- 20,00 ml HCl 0,1M titreren met NaOH 0,2M
- 20,00 ml HF 0,1M titreren met NaOH 0,2M

Dit voor 0,00 ml - 5,00 ml -10,00 ml -15,00 ml NaOH

Vraag 2) 5 punten

Op Schematische voorstelling van een pH-Ion gevoelige elektrode elk onderdeel kunnen benoemen op een tekening.

Lijndiagram voor een gecombineerde glasmembraan elektrode met de vier potentialen kunnen uitschrijven en potentialen bijschrijven.

Vraag 3) 5 punten

Helling van de calibratie van de glaselektrode kunnen berekenen met specifieke gegevens.

De formule voor de constante van de Nernstvergelijking 0,0592 kunnen schrijven.

Oefeningen

Vraag 1) 5 punten

zuur base reacties

100ml H_3AsO_3 0,1M

100ml Na_2HAsO_3 0,1M

100ml HCl 0,3M

vraag 2) 5 punten

pH berekenen

2024 juni Analytische chemie II

Theorie

Vraag 1: 10 pt

Complexvorming

A) Magnesium vormt met EDTA stabiele chelaatverbindingen. Verklaar dit begrip en leg de stabiliteit van die verbindingen uit in functie van de pH en de lading

B) Werk titratie uit voor 0,5,10,15 ml uit van Mg en EDTA (exact dezelfde die in de de theoriecursus stond)

Vraag 2: 10 pt

Conductometrie

i) uit vraag de celconstante K berekenen, geleidbaarheid en conductiviteit uit de literatuur waren gegeven

ii) concentratie van een onbekende koffie oplossing berekenen, waarden uit de conductometrische titratie hiervan waren gegeven

iii) titratiecurve schets maken

iv) titratiecurve verklaren (in dit geval was het BaCl_2 en Na_2SO_4 , je moest ook ergens de moleculaire en ionaire reactie hiervan schrijven)

Oefeningen

Vraag 1) 4 pt

Gaat MgC_2O_4 neerslaan als de $\text{pH} = 3$ met concentraties gegeven. Dezelfde oefening als sulfiden, maar dan met oxaalzuur

Vraag 2) 8 pt

Spectrofotometrie vraagstuk, je moest concentratie berekenen, molaire absorptiecoëfficiënt, absorptie berekenen en het percentage geabsorbeerd

- de energie van een foton bij een bepaalde golflengte wordt ook gevraagd

2024 Juni Lab Examen

Analytische II

Deel 1: toledo toets (15 pt)

mijn vragen waren:

- op wat is het eindpunt gebaseerd bij de methode van volhard?
- concentratie chloride ionen bepalen en je krijgt een schema met alle gegevens over de uitgevoerde titraties en standaardisaties (wat we ook in het labo hebben moeten doen bij labo 8)
- berekenen welk volume je moet micropipeteren als je een bepaalde concentratie wil uitkomen

Deel 2: spectrofotometrie (11 pt)

Doel formuleren (2pt)

Twee epjes gekregen: 1 oplossing met gekende concentratie van stof B en 1 oplossing met onbekende concentratie (dit is je persoonlijke staal)

Van de oplossing met gekende concentratie krijg je de concentratie gegeven en de ijklijn. Met deze oplossing moet je 1 standaardoplossing maken. De concentratie van die standaardoplossing geven ze ook, dus je moet letterlijk gewoon de verdunningsformule toepassen om te berekenen welk volume je van het epje moet nemen.

Met deze standaardoplossing ga je **λ_{max} bepalen** aan de spectrofotometer met SPECTRUM, op het examen zijn er dan twee vakjes voorzien waar je dus **λ_{max}** en **A_{max}** kan noteren (gwn aflezen op de spectrometer).

Daarna moet je de concentratie van je persoonlijke staal berekenen, deze moet je dus ook verdunnen. Ze zeggen niet hoeveel je moet overbrengen. Je moet hier dus een beetje gokken welke verdunning je gaat maken om een gepaste absorptantie te hebben.

Deze verdunde staal ga je nu gaan opmeten bij PHOTOMETRIC en nu kan je met behulp van de ijklijn de concentratie bepalen.

Deel 3: neerslagtitratie labo 8 (14 pt)

Je moet labo 8 opnieuw doen, maar nu enkel de titratie van het analiet. Er zijn bij deze opgave per examen een andere mogelijkheid, de lectoren komen omcirkelen welke jij gaat moeten doen. De

mogelijkheden zijn:

- bij het verdunnen van je staal: 15 , 20 of 25 ml nemen en verdunnen
- het eindresultaat dat je moet geven, de mogelijkheden waren mmol (Cl⁻), mg/100ml BaCl₂·2H₂O en nog iets

Dus elke student kan een andere combinatie krijgen, de werkwijze blijft hetzelfde natuurlijk, de berekeningen zijn gewoon anders.

Je krijgt de concentraties van de standaardisaties, maar je moet wel een titratieschema opstellen van heel de proef (3pt)

Dan moet je gewoon de titratie van je analiet uitvoeren, in het labo staan er bussen met de Ag⁺ en SCN⁻ met gekende concentratie. Pas op, doordat de verdunning anders is, zijn hier bij elke stof telkens 3 mogelijke bussen aanwezig omdat de concentratie die je nodig hebt anders is naargelang welke verdunning je van je analiet hebt moeten doen.

Dan de concentratie berekenen, sowieso in molair en dan in 1 extra eenheid dat de lector heeft omcirkeld op je examen, ik had mmol Cl⁻

- DOEL EN BESLUIT FORMULEREN (4 pt totaal)

Dit examen was hetzelfde als vorig jaar, maar hier heb je dus uitgebreidere informatie wat juist er gegeven en gevraagd was.